

APPENDICE III

GLOSSARIO DEI REPERTI

Arrossamento: iperemia locale più o meno associata ad edema.

Attenuazione dell'imene: riduzione significativa dell'altezza imenale.

Briglie periuretrali: sottili pliche mucose a decorso concavo intorno all'ostio uretrale

Cicatrici: è tassativo descrivere dimensioni, caratteristiche e colore.

Convessità (bump o mound): nodularità del bordo imenale di aspetto e colore sovrapponibili a quelli della membrana imenale stessa.

Discromia: variazione circoscritta di pigmentazione.

Ecchimosi: soffiatura emorragica sottopiteliale di cui è tassativo descrivere forma, dimensione e colore.

Escoriazione: perdita di sostanza superficiale dell'epitelio in un'area più o meno estesa (es. lesione superficiale da graffio).

Friabilità forchetta: particolare sottigliezza della cute che determina una estrema facilità alla lacerazione nelle comuni manovre di trazione.

Ipervascolarizzazione: chiara evidenza della trama vascolare per aumento del numero dei vasi e/o dilatazione dei vasi.

Perdita di sostanza: si intende una perdita di sostanza simile alla precedente ma che si approfondi fino allo stroma (guarigione che avviene per seconda intenzione con possibile tessuto di granulazione ed esiti cicatriziali).

Ragade: ulcera dermo-epidermica localizzata al fondo di una plica radiata, caratterizzata da scollamento dei bordi, talora con formazione di tasche ai due estremi e/o ai due poli, a forma di losanga o di racchetta. Il fondo può essere rossastro e sanguinante, se recente, di aspetto torpido se cronica. Per altre lesioni tegumentarie che non presentino questi caratteri, si segnaleranno soluzioni di continuo oppure perdite di sostanza, a seconda delle circostanze.

Sinechie: adesione tra superfici mucose e epiteliali non separabili senza cruentazione.

Soluzioni di continuo: lesione discontinuativa (in genere lineare) con margini accostabili che non comporta perdita di tessuto (es. taglio).

Tags: appendice cutanea o mucosa a livello perianale, vulvare o imenale.