

TABELLA 4

VACCINAZIONI PRIMA DEL CONCEPIMENTO		NOTE
Raccomandate	Morbillo, parotite, rosolia (MPR), varicella	Se non vaccinata e anamnesticamente negativa anche solo a una delle malattie elencate. Programmare la gravidanza 4 settimane dopo la vaccinazione.
	dTpa	Richiamo ogni 10 anni
	HPV	Se non effettuata la vaccinazione prima del 12° anno di età si può recuperare in età adulta.
VACCINAZIONI IN GRAVIDANZA		NOTE
Raccomandate	dTpa	Nel terzo trimestre, idealmente intorno alla 28° settimana, ad ogni gravidanza, indipendentemente dalla storia clinica e vaccinale.
	Influenza stagionale (inattivato)	Donne che all'inizio o nel corso della stagione epidemica dell'influenza si trovino nel secondo o terzo trimestre di gravidanza (ad ogni gravidanza).
Controindicate	Vaccini vivi attenuati (MPR, varicella, zoster, BCG)	Se somministrati inavvertitamente non comportano indicazioni alla interruzione volontaria di gravidanza.
Non raccomandate per dati non disponibili	HPV, pneumococco, tifo	Se somministrati inavvertitamente non comportano indicazioni alla interruzione volontaria di gravidanza.
Possibili a seguito di una valutazione personalizzata rischio/beneficio	Epatite A, Epatite B, meningococco, colera, febbre gialla, rabbia.	Se somministrati inavvertitamente non comportano indicazioni alla interruzione volontaria di gravidanza.
VACCINAZIONI NEL PUERPERIO		NOTE
Raccomandate	MPR e varicella	Se la donna non è stata vaccinata ed è anamnesticamente negativa anche solo a una della patologie.
	dTpa	Se la donna non è stata vaccinata in gravidanza. In tale evenienza è opportuna la vaccinazione dei contatti stretti (« <i>cocoon strategy</i> »).

Tabella 4

Le vaccinazioni raccomandate per le donne che programmano una gravidanza o si trovano in gravidanza o nel puerperio.



SCHEMA VACCINALE PER UNA PROTEZIONE OTTIMALE DI MADRE E BAMBINO

La protezione ottimale della madre e del bambino dovrebbe iniziare, se possibile, prima del concepimento, essendo alcune vaccinazioni non indicate in gravidanza, anche solo per dati insufficienti sulla sicurezza. Nello schema seguente (Tab. 4), sono sintetizzate le vaccinazioni da consigliare nelle donne prima del concepimento, durante la gravidanza ed il puerperio⁶.