INVECCHIAMENTO E SESSUALITÀ

Cosa succede in **POST MENOPAUSA**

Un'ampia indagine condotto nel Regno Unito ha fatto emergere aspetti importanti del rapporto tra donne e sessualità nel periodo post menopausa, ancora largamente inesplorato e fonte di imbarazzo per medici e pazienti



Lo studio

I ricercatori hanno proposto un sondaggio a 24.305 donne, metà delle quali avevano 64 anni o più,



Linda Carroll (Versione italiana per Quotidiano Sanità/Popular Science)

e hanno scelto di concentrare la sici e/o mentali della donna. compilato una sezione di com- le donne hanno riferito problemi lemento in cui descrivevano le loro gati ad esempio alla menopausa, coesperienze in modo più dettaglia- me la secchezza vaginale, ma anche to. Solo il 22,5% delle donne, tra i il fatto di sentirsi imbarazzate ri-50 e i 75 anni, hanno dichiarato di guardo al proprio corpo o la manaver avuto rapporti sessuali nel canza di libido. Parlare con un mecorso del mese precedente la rile- dico potrebbe permettere loro di rivazione. L'assenza di rapporti era solvere alcuni problemi, ma questo principalmente dovuta alla man- tipo di conversazioni "possono ridei casi), alla disfunzione ses- per i pazienti", osserva Harder. Non menopausa". suale del partner o a problemi fi- si parla molto del tema "sessualità e

invecchiamento", bisogna però riloro analisi sulle 4.418 che hanno Nella sezione dedicata ai commenti cordare che "l'invecchiamento in sé non è un ostacolo per una sana attività sessuale, e ci sono dei modi per conservarla".

Secondo Harder gli operatori sanitari dovrebbero essere più proattivi nell'affrontare l'argomento con le donne, invitarle, insieme ai loro partner, "a parlare più apertamente di possibili cambiamenti e preoccupazioni canza di un partner (nel 34,7% sultare difficili sia per i medici che associati all'invecchiamento o alla

Fonte: Menopause 2019



Il 22,5% delle donne, tra i 50 e i 75 anni, hanno dichiarato di aver avuto rapporti sessuali nel corso del mese precedente la rilevazione. L'assenza di rapporti era principalmente dovuta alla mancanza di un partner (nel 34,7% dei casi), alla disfunzione sessuale del partner o a problemi fisici e/o mentali della donna